



請將色卡們拼成長方形，上藏有中文字，對照中文字所屬的毒品級別，由左至右，依序會獲得到四個數字





## 中樞神經抑制劑 (麻醉藥品類)

# 中樞神經抑制劑 麻醉藥品類



通用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
美沙冬 Methadone	II	鎮痛 戒癮治療	注射 口服	1. 嗜睡、噁心、嘔吐、呼吸抑制、便秘、尿滯留、瞳孔縮小。 2. 海洛因主要濫用方式為靜脈注射，常因針頭不潔造成感染，共用針頭更可造成愛滋病、病毒性肝炎、梅毒等血液傳染疾病。具有極強生理及心理成癮性。
配西汀 Pethidine	II	鎮痛	注射	
可待因 Codeine	II-IV	鎮痛 止咳	注射 口服	<b>戒斷症狀</b> 打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻水、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發抖、嘔吐、腹瀉、肌肉痙攣、皮膚蟲蟻感。
丁基原啡因 Buprenorphine	III	鎮痛 戒癮治療	注射 口服 舌下	
特拉嗎竇 Tramadol	IV	鎮痛	注射 口服	

通用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
鴉片 Opium 精膏膏 芙蓉膏	I	鎮痛 止咳 吸食	經口 吸食	1. 嗜睡、噁心、嘔吐、呼吸抑制、便秘、尿滯留、瞳孔縮小。 2. 海洛因主要濫用方式為靜脈注射，常因針頭不潔造成感染，共用針頭更可造成愛滋病、病毒性肝炎、梅毒等血液傳染疾病。具有極強生理及心理成癮性。
嗎啡 Morphine 腐啡	I	鎮痛	注射 口服	<b>戒斷症狀</b> 打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻水、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發抖、嘔吐、腹瀉、肌肉痙攣、皮膚蟲蟻感。
海洛因 Heroin 白粉 四號 細仔	I	無	注射 吸食	
潘他唑新 Pentazocine 速賜康 孫悟空 猴仔	II	鎮痛	注射 口服	

## 中樞神經抑制劑 (非安眠劑)



## 中樞神經抑制劑 (非安眠劑)



## 中樞神經抑制劑 類安眠劑

通用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	適用危害
<b>西可巴比妥 (Secobarbital)</b> 紅中	III	鎮靜 安眠	意識障礙、運動失調、 暈眩、嗜睡、視覺障 礙、迷離、健忘、注意 力不集中、記憶力受 損、呼吸抑制。 <b>戒斷症狀</b> 頭痛、噁心、嘔吐、虛 弱、焦慮不安、易怒、失 眠、盜汗、顫抖、痙攣。
<b>異戊巴比妥 (Amytal)</b> 青發	III	鎮靜 安眠	同上
<b>其他</b> 甲噻酮 <b>Methaqualone (Norminox)</b> 白板	II	無	同上
<b>班二單亞基 Benzodiazepines</b>	分級	醫療用途	適用危害
<b>氟硝西泮 (Flunitrazepam)</b> (Rohypnol) 十字架 FM2	III	鎮靜 安眠	嗜睡、精神恍惚、運動 失調、頭痛、噁心、焦 躁不安、健忘、記憶力 不集中、意識不清。 <b>戒斷症狀</b> 焦慮、失眠、憂鬱、顫 抖、嘔吐、妄想、痙攣。
<b>硝甲西泮 (Nimetazepam)</b> (Erimin) 一粒眠 紅豆	III	鎮靜 安眠	同上
<b>三氫二氫平 (Alprazolam)</b> (Xanax) 蝴蝶片	IV	鎮靜 安眠	同上
<b>二氫平 (Diazepam)</b> (Valium) 安定 煩寧	IV	鎮靜 安眠	同上
<b>三唑他 (Triazolam)</b> (Halcion) 小白板	III	鎮靜 安眠	同上
<b>有機溶劑</b> Organic solvent 強力膠 打火機油 油漆 汽油	未列	無	吸入 意識不清、幻覺、口齒 不清、厭食、沮喪、焦 躁不安、妄想、噁心、 嘔吐、呼吸抑制、心律 不整、猝死、重複發作 之流鼻血及口鼻潰瘍。
<b>GHB</b> 液態搖頭丸 Liquid Ecstasy Georgia Home Boy G	II	無	口服 噁心、嘔吐、呼吸困難、 頭痛、失去意識、昏迷 及死亡，與酒精併用會 加劇其危險性。 <b>戒斷症狀</b> 失眠、焦慮、顫抖及流汗。 在美國GHB與Ketamine和 FM2同列為約書強毒丸。
<b>Ketamine</b> 卡門 K他命 Special K K仔 Cat vallium	III	手術 麻醉	口服 鼻吸 煙吸 注射 心悸過速、血壓上升、 噁心、嘔吐、流淚、視 視、視力障礙、影像扭 曲、頭暈、暫時性失憶 症、無法行走及急性精 神病。高劑量可造成呼 吸抑制致死。
<b>一氧化二氮</b> N <sub>2</sub> O 笑氣 吹氣球	未列	手術 麻醉	鼻吸 幻覺、失憶、憂鬱、不 同程度缺氧、肺氣腫、 氣胸、血痰、骨髓及周 邊神經病變。

## 中樞神經興奮劑

# 中樞神經興奮劑

常用藥物 / 俗名	分類	常用用途	常用方式	副作用
古柯莖 Cocaine 可卡因 快克 crack snow	I	胸部麻醉 止流鼻血	經口 鼻吸 煙吸	興奮、瞳孔擴張、失眠、躁動、狂怒、焦慮不安、食慾不振、惡心、嘔吐、妄想型精神病、心律不整、痙攣。 <b>戒斷症狀</b> 呆滯、嗜睡、焦慮、煩躁不安、憂鬱。
安非他命 Amphetamine 甲基安非他命 Methamphetamine 冰塊 冰棍 雷 安公子 安仔 烟仔	II	無	經口 煙吸 注射	1. 精神方面不良作用： 失眠、焦慮、鬱躁、鬱躁、情緒不穩、記憶減退、妄想、視幻覺、聽幻覺、譫妄、具攻擊性、自殺及殺人傾向、精神分裂症、神經系統損害等。 2. 心臟血管不良作用： 心跳加速、心悸、心律不整、高血壓、腦溢血。 3. 過量時： 會造成昏迷、體溫過高、橫紋肌溶解及急性腎衰竭，甚至導致死亡。 <b>戒斷症狀</b> 沮喪、憂鬱、全身乏力、睡眠障礙、焦慮感。
亞田雙氧 methylenedioxy-methamphetamine 搖頭丸 狂賣 忘我 綠錫牌 MDMA	II	無	口服	瞳孔擴張、欣快感、集感、頭痛、惡心、嘔吐、妄想、幻覺、恐慌、肌肉痙攣及發抖，過量可造成精神甚至死亡。

## 中樞神經迷幻劑及其他

# 中樞神經迷幻劑

常用藥物 / 俗名	分類	常用用途	常用方式	副作用
大麻 Cannabis Marijuana Hemp 草 麻仔 老鼠尾	II	無	口服 煙吸	吸食後會產生心跳加速、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習增加及認知能力降低，不孕症及動植物性炎症候群，孕婦吸食會造成流產或死產。 <b>戒斷症狀</b> 易怒不安、食慾減退、失眠、出汗、震顫、噁心、嘔吐。
麥角乙二胺 Lysergide (LSD) 搖頭丸 ELISA 加州陽光 白色閃光 Acid	II	無	口服 舌下	瞳孔擴張、欣快感、集感、頭痛、惡心、嘔吐、妄想、幻覺、恐慌、肌肉痙攣及發抖，過量可造成精神甚至死亡。
苯環利定 Phencyclidine (PCP) 天使塵 Love Boat	II	無	口服 煙吸	瞳孔擴張、步態不穩、惡吐、驚悸、失憶、妄想、焦慮不安及幻覺，過量可造成精神甚至死亡。

常用藥物 / 俗名	分類	常用用途	常用方式	副作用
Nitrites Amyl nitrite Isobutyl nitrite Poppers Rush Bolt	未列	無	舌下 吸入	流行於男性同性戀族群中，可造成面部及頸部潮紅、頭痛、惡性低血壓、心悸、暈眩、虛弱、不安、寒冷汗、蒼白、大腸缺血、惡心、嘔吐、反彈性高血壓、昏倒、休克及致死性雙性血紅素血症。

非藥物用途： 空間芳香劑。	
------------------	---

